

SUR DIVERS VERTÉBRÉS À SANG FROID DE LA RÉGION INDO-CHINOISE,

PAR M. PAUL CHABANAUD,

CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

I. — REPTILES.

CHAMAELEON KREMPFI Chab. ⁽¹⁾. — N'est autre que *Chamaeleon pardalis* Cuv. Les exemplaires étudiés appartiennent à la variété de couleur entièrement noire (*C. niger* Lesson) mentionnée par Duméril et Bibron ⁽²⁾.

Il est hors de doute que, malgré les affirmations qui m'ont été faites, ces individus sont originaires de Madagascar. Jusqu'à présent, aucun Caméléon n'a encore été trouvé dans la région indo-malaise.

II. — POISSONS.

DASYBATUS KREMPFI Chab. ⁽³⁾. — Description d'une femelle adulte.

	Centimètres.
Largeur du disque.....	35
Longueur du disque.....	41
Longueur du disque, y compris les nageoires pelviennes... .	43
Longueur de la queue.....	85 + ?

Diamètre longitudinal de l'œil égal à la moitié de la longueur des événements. Toute la face supérieure du disque et de la queue couverte de scutelles serrées les unes contre les autres, assez grosses sur le milieu du dos, de plus en plus fines vers la périphérie et devenant extrêmement fines près des bords du disque, ainsi qu'à l'extrémité de la queue. Au centre, une grosse scutelle en forme de perle, suivie d'une série longitudinale, assez régulière, de scutelles spiniformes, s'étendant jusqu'aux éperons barbelés de la queue. Deux séries de papilles buccales; la série antérieure composée

⁽¹⁾ *Bulletin du Muséum*, 1923, p. 203.

⁽²⁾ *Herpétologie générale*, III, p. 228-230.

⁽³⁾ *Bulletin du Muséum*, 1923, p. 47.

de 4 papilles, dont les deux médianes très longues et les deux externes petites; la série postérieure formée de deux papilles médianes arrondies et de deux externes, de même forme et placées un peu en arrière des médianes.

Dessus brun clair, marbré de noirâtre.

Pnom-Penh. — Collection du Muséum, n° 1923-71.

SILLAGO BOUTANI Pellegrin. — Le *type* de cette espèce provient de la baie d'Along. Une dizaine d'exemplaires, de taille un peu inférieure à celle du *type*, ont été capturés par M. A. Krempf sur la côte d'Annam.

Collection du Muséum, n° 1923-72 à 75.

Il s'est glissé une erreur dans la description de cette espèce, dont le texte porte : « mâchoire inférieure proéminente »; c'est *mâchoire supérieure proéminente*, qu'il faut lire ⁽¹⁾.

GNATHOLEPIS CALLIURUS Jord. et Seale. — Décrite sur cinq spécimens originaires des Philippines ⁽²⁾, cette espèce paraît commune dans les eaux indo-chinoises : 35 individus proviennent du Tonkin; trois autres, de plus petite taille, ont été rapportés par M. Krempf, du golfe de Siam. Les plus grands exemplaires mesurent 79 millimètres de longueur totale.

Il y a lieu d'ajouter à la description originale : rayons des pectorales au nombre variant de 16 à 18, le plus souvent 17. Vertèbres 10 + 16.

Collection du Muséum, n° 1923-76 à 85.

(LABORATOIRE DE M. LE PROFESSEUR GRUVEL.)

⁽¹⁾ *Bull. Soc. Zool. France*, 30, 1905, p. 87. Rectification faite d'accord avec le D^r J. Pellegrin.

⁽²⁾ *Proc. U. S. National Museum*, 28, 1905, p. 796.